

Attempt questions

- 1 A frequency polygon is a many sided:
 a) Closed figure b) Rectangle
 c) Circle d) Triangle
- 1 تعدادی کشیر الاضلاع کئی پہلوؤں کی ایک ----- ہے۔
 a) بند شکل (ب) مستطیل
 b) دائرہ (c) مثلث
- 2 The positive square root of mean of the squared deviation of X_i ($i=1,2,3,\dots,n$) observations from their arithmetic mean is called:
 a) Harmonic mean b) Range
 c) Standard deviation d) Variance
- 2 X_i مرات کے حسابی اوسط سے انحراف کے مربعوں کے حسابی اوسط کے ثابت جذر کو کہتے ہیں۔
- a) ہم آہنگ اوسط (b) سعت
 b) معیاری انحراف (c) تغیریت
- 3 The most frequent occurring observation in a set of data is called:
 a) Mode b) Median
 c) Harmonic mean d) Mean
- 3 کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مکملاتی ہے۔
 a) عادہ (b) وسطانیہ
 b) ہم آہنگ اوسط (c) اوسط
- 4 A grouped frequency table is called:
 a) Data b) Frequency distribution
 c) Frequency polygon d) None of these
- 4 گروہی تعدادی جدول کہلاتی ہے۔
 a) مواد (b) تعدادی تقسیم
 c) تعدادی کشیر الاضلاع (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 5 The mean of the squared deviations of X_i observations from their arithmetic mean is called:
 a) Variance b) Standard deviation
 c) Range d) Harmonic mean
- 5 X_i مرات کے حسابی اوسط سے انحراف کے مربعوں کے حسابی اوسط کو کہتے ہیں۔
- a) تغیریت (b) معیاری انحراف
 b) سعت (c) ہم آہنگ اوسط
- 6 The measure which determines the middle most observation in a data set is called:
 a) Median b) Mode
 c) Mean d) Range
- 6 ایسا پیکانہ جو مواد کی درمیانی مدیتائے ---- کہلاتا ہے۔
 a) عادہ (b) وسطانیہ
 b) سعت (c) اوسط
- 7 In a cumulative frequency polygon frequencies are plotted against:
 a) Mid point
 b) Upper class boundaries
 c) Class limits
 d) Lower class boundaries
- 7 مجموعی تعدادی کشیر الاضلاع میں تعدادات کو ----- کے مقابل نقشہ پر ظاہر کیا جاتا ہے۔
 a) درمیانی نقطہ (b) بالائی جماعتی حدود
 b) جماعتی حدود (c) زیریں جماعتی حدود
- 8 A histogram is a set of adjacent.
 a) Squares b) Rectangles
 c) Circles d) Closed figures
- 8 کالی نقشہ ایک مجموعہ سے متصل
 a) مربعوں کا (b) مستطیلوں کا
 b) دائروں کا (d) بند شکل کا